

Cirrhopetalum curtisii Hook.f.

HELMIKUU 2003

Bulbophyllum corolliferum J.J.Sm.; *Bulbophyllum curtisii* (Hook.f.) Ridl. (1911); *Bulbophyllum curtisii* var. *purpureum* (Ridl.) J.J.Sm. *Bulbophyllum pulchellum* var. *purpureum* Ridl.; *Cirrhopetalum concinnum* var. *purpureum* Ridl.; *Cirrhopetalum corolliferum* auct.; [non *Bulbophyllum curtisii* Ridl. (1903)]

Teksti ja kuva © Visa Lipponen

Kotiseutu

Cirrhopetalum curtisii on kotoisin Thaimaasta, Malakan niemimaalta, Sumatrasta ja Borneosta.

Kukinta-aika

Lajilla ei ole pääsääntöistä kukinta-aikaa, ja uusia kukintoja kehittyy läpi vuoden. Kukinnossa on tavallisesti 6-13 leveydeltään noin puolisenttistä ja pituudeltaan noin puolitoistasenttistä kukkaa, jotka avautuvat samanaikaisesti siten, että kukinto muistuttaa pientä sateenvarjoa. Kukkat kestävät vain kolme päivää, jonka jälkeen ne varisevat pois.

Hoito-ohjeet

Kunnolla viihtyäkseen *Cirrhopetalum curtisii* vaatii orkideakaapin korkeaa ilman kosteutta. Lajia voi kasvattaa ruukussa epifyyiteille tarkoitettussa kasvualustassa, mutta parhaiten se viihtyy joko rimakorissa tai pystyasentoon ripustetussa puusaniaislevyssä. Lajilla ei ole lainkaan lepoaikaa, ja se viihtyy hyvin normaalissa huoneenlämmössä. Puusaniaislevyllä kasvaessaan se vaatii päivittäistä kastelua, mutta kasvualustan pitää kuivahtaa kastelujen välillä. Rimakorissa kosteutta pidättävämmässä kasvualustassa kasteluväli on harvempi ja uudelleen kasteluun on tarvetta vasta, kun kasvualusta on kuivahtanut edellisen kastelun jäljiltä. Viihtyessään laji lisääntyy nopeasti kasvullisesti. Liian suureksi kasvaneen yksilön voi huoletta jakaa milloin tahansa. *Cirrhopetalum*it saattavat joskus olla pitkäänkin kukkimatta. Ne reagoivat kuitenkin herkästi kaikkiin pieniin muutoksiin, usein kukkimalla. Jos kasvisi on pitkään kukkimatta, niin siirrä se orkideakaapissasi toiseen paikkaan. Tämä pieni muutos saattaa laukaista kasvin kukinnan.



Taksonomiasta

Tutkijat kiistelevät yhä siitä, voiko *Cirrhopetalum*-sukua hyväksyä ollenkaan, vai pitääkö se sisällyttää *Bulbophyllum*-sukuun. Jos *Cirrhopetalum curtisii*n katsotaan kuuluvan *Bulbophyllum*-sukuun, niin silloin sen tieteellinen nimi on *Bulbophyllum corolliferum*. Lajiepiteetti *curtisii* muuttuu *corolliferum*iksi siitä syystä, että *Bulbophyllum*-suvussa on (jo) olemassa Ridleyyn vuonna 1903 kuvaama laji *Bulbophyllum curtisii* Ridl., jota ei kuitenkaan pidä sekoittaa tässä esitettyyn *Cirrhopetalum curtisii*hin. Nimistösekaannusta aiheuttaa myös se, että

Ridley teki erehdyksessä vuonna 1911 uuden kombinaation *Bulbophyllum curtisii* (Hook.f.) Ridl. muistamatta, että hän oli jo aikaisemmin antanut saman nimen toiselle lajille. Tämä jälkimmäinen *B. curtisii* (Hook.f.) Ridl. (ei siis sama laji kuin *B. curtisii* Ridl.) taas on *Cirrhopetalum curtisiin* synonyymi.
